

اومكس دي بي 98

0-28-12.6
N - P - K

الوظيفة

من المعروف ان عنصر الفوسفور مهم جدا للنباتات من اجل الحصول علي محصول جيد . ولان عوامل مثل رطوبة التربة ودرجة ال **PH** ونوعها تؤثر علي كمية الفوسفور الميسر للامتصاص من التربة والمهم اثناء مراحل النمو الحرجة للنبات , فالفوسفور المضاف للتربة مع السماد الارضي يعتبر وحده غير كافي كمصدر للفوسفور المهم للنبات في مراحل نموه الحرجة

الوصف

الفوسفور في صورة **PO3** هو مصدر قابل للذوبان في الماء بشكل كامل وخصوصا اذا تم تطبيقه عن طريق الرش الورقي مصادر الفوسفور التقليدية بالسوق ينتقل فيها الفوسفور داخل النبات من خلال الخشب ولكن الفوسفور في اومكس دي بي ينتقل بشكل فريد من خلال كلا من الخشب واللحاء وبالتالي توفير عنصر الفوسفور بشكل اكبر لمنطقة الجذور وكذلك الي باقي اجزاء المحصول



تحليل اومكس دي بي 98

وزن/حجم

0 %	N	النيروجين
28 %	P ₂ O ₅	الفوسفور
12.6 %	K ₂ O	البوتاسيوم
5.0-6.0		PH (محلول 10%)
1.35		الكثافة النسبية

طريقة الاستخدام

يجب ملء تانك الرش بالماء الي نصف الكمية المطلوبه للرش ثم معايرة الكمية المستخدمه من اومكس دي بي ثم تضاف الي التانك مع التقليب الجيد ثم بعدها تضاف كمية المياه المتبقية الي التانك وتتم عملية الرش



التخفيف

كمية المياه الموصي بها للهكتار هي
500 : 1500 لتر ماء

دائماً تأكد من رج العبوة قبل الاستخدام

نتائج استخدام اومكس دي بي 98

تحسين صحة النبات ومقاومته للأمراض
تحسين عمل المجموع الجذري
زيادة نسبة العقد والثمار
ارتفاع نسبة المواد الصلبة

زيادة الانتاجية
تحسين جودة المحصول وطول فترة صلاحية الثمار
دعم الامتصاص الورقي للكاتيونات مثال
البوتاسيوم-الكالسيوم-الماغنسيوم-المنجنيز

توصيات الاستخدام

المحصول	لتر / هكتار	ملي / 100 لتر	التطبيق
التفاح	4	800	الرش عند تساقط البتلات ويكرر كل 7 ايام
الكرنب	2	400	الرش عند 2 - 4 اوراق ويكرر حسب الحاجه
الجزر	2	400	الرش عند 3 - 4 اوراق ويكرر حسب الحاجه
الموالح	4	400	الرش عند بداية النمو الجديد ويكرر كل 10-14 ايام
الخص	4	400	في الربيع يستخدم كسقية للجذور رشتين , الاولي بعد 7 - 10 ايام من الزراعة الرشة الثانية بعد الاولي ب 10 - 14 يوم
البصل والكراث	2	400	الرش عند 3 - 4 اوراق ويكرر حسب الحاجه
نباتات الزينة	4	200 : 400	الرش عند بداية النمو ويكرر كل 10 - 14 يوم
اناناس	3 : 4	400	رش ورقي كل 14 يوم
البطاطس	0.3	400	سقية لصواني الزراعة
التوت الاحمر	2	400	الرش عند بداية نمو الدرنات ويكرر كل 14 يوم
الفراولة	4	800	الرش عند بداية البرعم الاخضر ويكرر كل 21 يوم

احتياطات الخلط

اومكس دي بي 98 ملائم للخلط مع معظم المبيدات ومنظمات النمو والعناصر المغذية الصغرى ولكن ليس كلها مناسب للخلط معه , مع الاخذ في الاعتبار التفاعلات الناتجة عن الخلط والتأثير علي النبات ولذلك يجب اجراء تجربة خلط مصغرة قبل التعميم والشركة لا تتحمل اي مسؤولية عن سوء الاستخدام بما في ذلك الحرارة وحالة النبات المعامل ومرحلة النمو وكمية المياه المستخدمه

احتياطات الامان

يجب تخزين اومكس دي بي 98 بعيدا عن التجميد تتراوح درجة حرارة التخزين المناسبه بين 5-40°C وهو ماده غير خطرة وغير قابلة للاشتعال يجب ارتداء القفازات وواقي الوجه عند التعامل مع الماده في حالة التخزين لفترة طويلة قد يحدث ترسيب خفيف للماده ولذلك يجب الرج قبل الاستخدام

العبوات

اومكس دي بي 98 متاح في عبوات سعة لتر و 5 لتر



H.Q. المركز الرئيسي +966 13 581 5588
P.O. Box : 158 ص.ب : +966 13 581 5895
الاحساء : 31982 AHSA : info@alyaseenagri.com
السعودية SAUDI ARABIA : www.alyaseenagri.com